

147703-004

NexGard®

(afoxolaner) tablete mastigável para cães

NexGard® (afoxolaner) tablete mastigável para cães.

Mata pulgas e carrapatos em cães.
Uso oral.

USO VETERINÁRIO

Descrição:

NexGard® (afoxolaner) está disponível em quatro apresentações de antiparasitários na forma de tabletes mastigáveis macios com sabor de carne bovina para administração oral em cães adultos e filhotes de acordo com seu peso. Cada tablete mastigável antiparasitário é formulado para proporcionar uma dosagem mínima de afoxolaner de 2,5 mg/kg.

Características:

- NexGard® é altamente palatável;
- NexGard® mata pulgas antes que coloquem ovos;
- NexGard® tem um rápido início de ação e atinge 100% de eficácia em 8 horas contra pulgas;
- NexGard® controla rapidamente a reinfestação de pulgas adultas recém-adquiridas e carrapatos por um mês.

Indicações:

NexGard® mata pulgas e carrapatos em cães adultos e filhotes acima de 8 semanas de idade, com peso corporal mínimo de 2,0 kg. É indicado para o tratamento e prevenção de infestação por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) e tratamento e controle das infestações causadas por carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Amblyomma americanum*, *Ixodes holocyclus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*).

Mecanismo de Ação:

O afoxolaner é membro da família da isoxazolininas. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem de íons cloreto através das membranas celulares (pelos neurotransmissores GABA). Uma hiperexcitação prolongada induzida pelo afoxolaner resulta em atividade descontrolada do sistema nervoso central e morte de insetos e ácaros. A toxicidade do afoxolaner é específica para os invertebrados, contribuindo para a margem de segurança em mamíferos.

Dosagem e Administração:

NexGard® é administrado oralmente, uma vez ao mês, na dosagem mínima de 2,5 mg/kg.

Esquema de Dosagem:


Peso Corporal	Quantidade de tablete mastigável de NexGard® administrado	Afoxolaner por tablete mastigável de NexGard® (mg)	Tablete mastigável de NexGard® (g)
2 a 4 kg	1	11,3	0,5
4,1 a 10 kg	1	28,3	1,25
10,1 a 25 kg	1	68	3
25,1 a 50 kg	1	136	6
Acima de 50 kg	Administre a combinação apropriada de antiparasitários mastigáveis		

NexGard® é altamente palatável e pode ser oferecido diretamente ao cão. Administre o tablete mastigável de uma forma que estimule o cão a mastigá-lo. Não há nenhuma recomendação de regime alimentar para a administração de NexGard®, podendo ser oferecido junto com o alimento ou não. Deve-se ter cuidado para que o cão consuma a dose completa, portanto os animais tratados devem ser observados por alguns minutos para se assegurar que uma parte da dose não seja perdida ou recusada. Na suspeita de que parte da dose ou a dose completa foi perdida ou caso ocorra vômito dentro de duas horas após a administração, administre uma nova dose completa.

Tratamento e Prevenção de Pulgas e Carrapatos:

O tratamento com NexGard® pode começar em qualquer época do ano. Nas áreas onde pulgas e/ou carrapatos são comuns, recomenda-se que o tratamento mensal com NexGard® continue pelo ano inteiro, sem interrupção. NexGard® não é repelente; as pulgas e carrapatos precisam picar e iniciar sua alimentação no hospedeiro para serem expostos ao princípio ativo afoxolaner, portanto, o risco de transmissão de doenças por esses vetores não pode ser excluído. Dados de estudos realizados em laboratório e a campo demonstram que NexGard® mata as pulgas antes que consigam colocar ovos, evitando infestações subsequentes após o início do tratamento das infestações por pulgas já existentes.

IMPORTANTE: Para minimizar a probabilidade de reinfestação por pulgas e carrapatos, torna-se importante tratar todos os animais que convivem no mesmo ambiente. Além disso, é necessário fazer um controle estratégico integrado do ambiente, com produtos



específicos, seguindo as recomendações do fabricante. As formas imaturas presentes no ambiente, no momento da aplicação, podem continuar seus ciclos, havendo reinfestação dos animais mesmo após o tratamento. Consulte o médico-veterinário para maiores informações.

Segurança:

Em um estudo de campo controlado, NexGard® foi utilizado concomitantemente com outras medicações, tais como vacinas, anti-helmínticos, antibióticos (incluindo tópicos), esteroides, AINEs, anestésicos e anti-histamínicos. Não se observaram reações adversas decorrentes do uso concomitante de NexGard® com outras medicações. Estudos demonstraram uma ampla margem de segurança em cães com 8 semanas de idade ou mais. Em um destes estudos, administraram-se NexGard® oralmente em filhotes de Beagles de 8 a 9 semanas de idade em 1, 3 e 5 vezes a dose de exposição máxima (6,3 mg/kg) por três tratamentos a cada 28 dias, seguidos por três tratamentos a cada 14 dias, por um total de seis tratamentos. Não houve efeitos clinicamente relevantes relacionados ao tratamento no exame físico, peso corporal, consumo alimentar, nos parâmetros clínico-patológicos (hematologia, bioquímica clínica ou testes de coagulação), na patologia macroscópica, histopatologia ou no peso de órgãos. A ocorrência de vômito foi semelhante no grupo tratado e no grupo controle.

Reações adversas:

Em um estudo de campo controlado, foi rara a observação de vômito, pele seca/escamosa ou irritada (prurido), diarreia, letargia e anorexia. Esses eventos não foram considerados graves, além de ocorrerem de forma autolimitante, com curta duração e em menor intensidade nas doses subsequentes.

Contraindicações:

Não há contraindicações conhecidas para o uso do NexGard®.

Precauções:

Afoxolaner é um membro da classe das isoxazolininas. Esta classe farmacológica tem sido associada muito raramente a reações neurológicas adversas.

Os principais eventos adversos relatados, em ordem decrescente de frequência, são: vômitos, prurido, letargia, diarreia (com e sem sangue), anorexia, convulsões, hiperatividade/inquietação, respiração ofegante, eritema, ataxia, dermatites (incluindo erupções cutâneas, pápulas), reações alérgicas (incluindo urticária, inchaço) e tremores. Recomenda-se cautela de uso em cães com histórico de convulsões ou distúrbios neurológicos. Sempre consulte o médico veterinário antes do uso.

Não se avaliou o uso do NexGard® em cães em reprodução, prenhes ou lactantes.

As pulgas e os carrapatos precisam picar o cão para serem expostos ao medicamento, portanto o risco de transmissão de doenças causadas por carrapatos e pulgas não pode ser excluído.

ESTE PRODUTO NÃO É INDICADO PARA GATOS.

NÃO SE DESTINA A USO POR HUMANOS.

EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, CONTATE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE

Apresentação:

NexGard® está disponível em quatro apresentações de antiparasitários mastigáveis macios com sabor de carne bovina: 0,5g, 1,25g, 3,0g e 6,0g. Os antiparasitários mastigáveis são vendidos em blisters com 1, 3, 4 ou 6 unidades.

Conservação:

Manter em lugar fresco e seco, sob temperatura entre 15°C e 30°C e ao abrigo da luz.

Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Fazenda São Francisco s/n - Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55 - Indústria Brasileira

Resp. Técn.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº9.851/2014, em 30/10/2014.

SAC 0800 888 7387



H00-E0244T